

1 Descripción

Suspensión de esporas viables de *Bacillus anthracis*, cepa Max Sterne 34F2, no encapsulada y no virulenta, en glicerol-suero fisiológico conteniendo saponina como adyuvante.

2 Composición

Suspensión de esporas de *Bacillus anthracis* cepa Sterne 34F2 ($\geq 10^7$ esporas/dosis bovina).

3 Especies de destino

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

4 Indicaciones

Vacuna para la prevención del Carbunco Bacteridiano (Ántrax) producida por *Bacillus anthracis*.

5 Vía de administración

Vía subcutánea. Agitar antes y durante el uso.

6 Dosis

Bovinos: 2 mL

Ovinos, caprinos y porcinos: 1 mL

Primovacunación: a partir de los 3 meses de edad aplicar una dosis. Revacunar anualmente.

7 Presentaciones

Frasco multidosis conteniendo 50 mL

Frasco multidosis conteniendo 100 mL

Frasco multidosis conteniendo 250 mL

8 Usos durante gestación y lactancia (cuando corresponda)

No aplicar en hembras preñadas.

9 Interacción con otras vacunas o medicamentos

Puede ser administrado paralelamente a otras vacunas, vitaminas o minerales, siempre y cuando los sitios de inoculación sean diferentes.

10 Período de inmunidad

La inmunidad se establece a los 10 a 14 días posteriores a la inoculación y dura un año.

11 Contraindicaciones

No aplicar en hembras preñadas.

12 Tiempo de espera

Los animales no deben ser faenados para consumo humano dentro de los 21 días posteriores a la vacunación.

13 Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Usar bajo supervisión de un médico veterinario. Vacunar animales en buen estado de salud y correctamente desparasitados para obtener una inmunización satisfactoria.

Usar material estéril para su aplicación y aplicar estrictas medidas de asepsia.

La administración de inyectables en animales sensibles puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con antihistamínicos, epinefrina o corticoides.

No administrar por otras vías que no sean las indicadas.

Utilizar todo el contenido después de abierto el frasco.

No reutilizar los recipientes vacíos.

14 Almacenamiento

Conservar entre 2 °C y 8 °C. No congelar.

15 Naturaleza y contenido del envase

Envases plásticos multidosis de polipropileno con tapón de caucho sintético y precinto de seguridad de aluminio.

16 Validez

24 meses después de su fecha de elaboración

17 Titular de la autorización de comercialización y número de registro

En Uruguay: Virbac Uruguay S.A., N° Reg. MGAP 2015A00200