

## **1 Descripción**

Clostrisan 9+T es una suspensión de cultivos químicamente inactivados de 10 cepas clostridiales adsorbidas en hidróxido de aluminio.

## **2 Composición**

### Ingredientes activos:

*Clostridium chauvoei*

*Clostridium novyi* tipo B

*Clostridium perfringens* tipo D

*Clostridium perfringens* tipo B

*Clostridium perfringens* tipo C

*Clostridium perfringens* tipo A

*Clostridium septicum*

*Clostridium haemolyticum*

*Clostridium sordellii*

*Clostridium tetani*

### Adyuvante:

Hidróxido de aluminio

## **3 Especies de destino**

Bovinos, ovinos y caprinos.

## **4 Indicaciones**

Vacuna para la prevención de carbunco sintomático o mancha, gangrena gaseosa o edema maligno, enterotoxemias: enteritis hemorrágica, enterotoxemia del ternero y disentería del cordero, enterotoxemia hemorrágica, riñón pulposo, hemoglobinuria bacilar, hepatitis necrótica infecciosa, muerte súbita por clostridiosis y tétanos en bovinos, ovinos y caprinos.

## **5 Vía de administración**

Vía subcutánea o intramuscular.

## **6 Dosis**

Bovinos: 5 mL

Ovinos y caprinos: 2 mL

Aplicar una segunda dosis a los 21-30 días. Revacunar anualmente.

## **7 Presentaciones**

Frasco multidosis conteniendo 100 mL (20 dosis bovinas).

Frasco multidosis conteniendo 250 mL (50 dosis bovinas).

**8 Usos durante gestación y lactancia (cuando corresponda)**

En hembras gestantes se recomienda que la segunda dosis de la primovacuna o la única dosis de la revacunación anual se administren 30 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos calostrales.

**9 Interacción con otras vacunas o medicamentos**

Puede ser administrado paralelamente a otras vacunas, vitaminas o minerales, siempre y cuando los sitios de inoculación sean diferentes.

**10 Período de inmunidad**

A los 15 días de la segunda dosis de la primovacuna los animales están inmunizados y la duración de la inmunidad es de un año.

**11 Contraindicaciones**

No presenta.

**12 Tiempo de espera**

No presenta.

**13 Precauciones**

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Usar bajo supervisión de un médico veterinario. Vacunar animales en buen estado de salud y correctamente desparasitados para obtener una inmunización satisfactoria.

Usar material estéril para su aplicación y aplicar estrictas medidas de asepsia.

La administración de inyectables en animales sensibles puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con antihistamínicos, epinefrina o corticoides.

No administrar por otras vías que no sean las indicadas.

Utilizar todo el contenido después de abierto el frasco.

No reutilizar los recipientes vacíos.

**14 Almacenamiento**

Conservar entre 2 °C y 8 °C protegido de la luz. No congelar.

**15 Naturaleza y contenido del envase**

Envases plásticos multidosis de polipropileno opaco color blanco con tapón de caucho sintético y precinto de seguridad de aluminio.

**16 Validez**

24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**17 Titular de la autorización de comercialización y número de registro**

En Uruguay: Virbac Uruguay S.A., N° Reg. MGAP A-4746